

ПРОГРАМА

XIX конференція
Української
Протиепілептичної Ліги

«ЕПІЛЕПСІЯ ТА КОМОРБІДНІ СТАНИ»

17-19 вересня 2015 р.
м. Одеса

Шановні колеги!

Ми раді вітати Вас в місті Одесі на XIX Конференції Української Протиепілептичної Ліги з міжнародною участю «ЕПІЛЕПСІЯ ТА КОМОРБІДНІ СТАНИ». Сподіваємося що отримана сучасна інформація буде корисною в Вашій подальшій науковій та практичній діяльності.

Коморбідність включає в себе різну соматичну, психіатричну і неврологічну патологію, їх комбінації, які зустрічаються при епілепсії і можуть мати єдиний патогенетичний механізм або трактуватися як ускладнення захворювання. У цьому плані Конференція, яка традиційно проводиться Українською Протиепілептичною Лігою, продовжить об'єднання поглядів фахівців різних напрямків для оптимального рішення виникаючих у цьому плані проблем. Запрошені провідні фахівці дозволять обговорити основні події та положення, що стосуються коморбідності при епілепсії.

Сподіваємося, що наша зустріч в Південній Пальмірі в чудовий період бабиного літа дасть можливість зустрітися з друзями, створить, зміцнить і підтримає співпрацю між дослідниками, практикаками і сприятиме кращому розумінню такого поширеного і важкого мозкового розладу, яким є епілепсія.

З повагою, Оргкомітет.

Генеральний спонсор - *SANOFI*



ІНФОРМАЦІЙНІ СПОНСОРИ



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА
НАРКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТА ВІДНОВНОЇ МЕДИЦИНИ
(УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА) ОНМедУ
ХАРЬКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНСЬКА ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНА ЛІГА
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЛІНІЧНИХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІВ
ХАРЬКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПЕЛ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ МЕДИЦИНИ «РІМОН»**

**XIX конференція
Української Протиепілептичної Ліги**

**«ЕПІЛЕПСІЯ ТА
КОМОРБІДНІ СТАНИ»**

**17-19 вересня 2015 р.
м. Одеса**

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Васьтянов Р.С.

Дубенко А.Є.

Калашников В.Й.

Літовченко Т.А.

Селюков Г.І.

Сухоносова О.Ю.

Харітонов В.І.

Горанський Ю.І.

Зубов П.Г.

Коростій В.І.

Муратова Т.М.

Стоянов О.М.

Таницура Л.М.

Харчук С.М.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

17 вересня 2015 р.

- 11⁰⁰ – 11³⁰ **Відкриття конференції**
Привітання: *Запорожан В.М., Дубініна В.Г., Муратова Т.М., Харчук С.М., Дубенко А.Є.*
- 11³⁰ – 13³⁰ **Пленарне засідання №1**
Головуючі: *Дубенко Є.Г., Евтушенко С.К.*
- 11³⁰ – 11⁵⁰ **Дубенко Є.Г. (м. Харків, Україна)**
Роль антиепілептичного метаболізму в лікуванні хворих на епілепсію
- 11⁵⁰ – 12¹⁰ **Мар'єнко Л.Б. (м. Львів, Україна)**
Фармакорезистентність - чи завжди вона справжня?
- 12¹⁰ – 12³⁰ **Дубенко А.Є., Богданова Т.В. (м. Харків, Україна)**
Епілепсія та порушення сну – диференційна діагностика та коморбідність
- 12³⁰ – 12⁵⁰ **Горанський Ю.І. (м. Одеса, Україна)**
Гендерні питання епілептології
- 12⁵⁰ – 13¹⁰ **Літовченко Т.А. (м. Харків, Україна)**
Міоклонічні епілепсії
- 13¹⁰ – 13³⁰ **Євтушенко С.К. (м. Харків – Донецьк, Україна)**
Раптова смерть у хворого на епілепсію (SUDEP)
- 13³⁰ – 14²⁰ **Обід**
- 14²⁰ – 16⁰⁰ **Пленарне засідання №2.**
Головуючі: *Літовченко Т.А., Таницюра Л.М.*
- 14²⁰ – 14⁴⁰ **Літовченко Т.А. (м. Харків, Україна)**
Сучасні погляди на політерапію епілепсії

- 14⁴⁰ – 15⁰⁰ **Танцура Л.М. (м. Харків, Україна)**
*Фармакорезистентні епілепсії та нові
можливості їх лікування*
- 15⁰⁰ – 15²⁰ **Харитонов В.І. (м. Київ, Україна)**
Аспекти рефрактерних епілепсій у дітей
- 15²⁰ – 15⁴⁰ **Сухоносова О.Ю., Дубенко А.Є.,
Літовченко Т.А., Танцура Л.М.,
Полякова О.В., Сергієнко О.В.
(м. Харків, Україна)**
*Створення Регістру хворих на епілепсію дітей
та дорослих*
- 15⁴⁰ – 16⁰⁰ **Орос М.М., Луц В.В. (м. Ужгород, Україна)**
*Епілепсія та інсульт: вирішення двох проблем
в одного пацієнта*
- 16⁰⁰ – 16¹⁰ **Кава-брейк**
- 16¹⁰ – 17⁵⁰ **Пленарне засідання №3.**
Модератори: **Дубенко А.Є., Орос М.М.**
- Presidential Symposium 31st International
Epilepsy Congress. Integrated: pathophysiology
/ clinical / social. «Doctor, is my epilepsy
genetic and what consequences does it
have?» (Президентський симпозіум 31-
го Всесвітнього Епілептичного конгресу.
Об'єднання патофізіологічних, клінічних
та соціальний аспекти «Доктор чи є моя
епілепсія генетично обумовленою і які це має
наслідки» - запис з перекладом)**
Sam Berkovic (Australia).
*How genetics are changing the epilepsy
landscape*

Iscia Lopes-Cendes (Brazil).

I'm confused - who do I test, when do I test, how do I test? And what do I tell the patient?

Sanjay Sisodiya (United Kingdom).

How genes affect response to treatment

Tracy Dixon-Salazar (United States).

The pros and cons of knowing the answer

18⁰⁰

***Від'їзд до Одеського Національного театру
Опери та Балету***

18 вересня 2015 р.

08⁰⁰ – 09⁰⁰

Сніданок

09⁰⁰ – 11³⁰

Пленарне засідання №4

Головуючі:

Горанський Ю.І., Орос М.М.

09⁰⁰ – 09²⁰

Дубенко А.Є. (м. Харків, Україна)

Можливості лікування епілептичного статусу

09²⁰ – 09⁴⁰

Орос М.М. (м. Ужгород, Україна)

Коморбидність депресії і епілепсії. Сучасний погляд на проблему

09⁴⁰ – 10⁰⁰

Горанський Ю.І. (м. Одеса, Україна)

Ефективність моно- і комбінованої терапії при парціальних нападах

10⁰⁰ – 10²⁰

Мартинюк В.Ю., Ярмолюк Т.П.,

Надоненко О.М. (м. Київ, Україна)

Епілептичні синдроми у дітей з церебральним паралічем

10²⁰ – 10⁴⁰

Літовченко Т.А. (м. Харків, Україна)

Клінічні особливості аутомотороних нападів

10⁴⁰ – 11⁰⁰

Латишев Д.Ю. Цимбалюк В.І., Дзяк Л.А.

(м. Дніпропетровськ, м. Київ, Україна)

Хірургічне лікування фармакорезистентних

	епілепсій методом множинних субпіальних трансекцій
11 ⁰⁰ – 11 ²⁰	Кава-брейк
11 ²⁰ – 13 ⁰⁰	Пленарне засідання № 5
Головуючі:	Костюк К.Р., Вастьянов Р.С.
11 ²⁰ – 11 ⁴⁰	Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Чебурахін В.В., Канайкін О.М., Дічко С.М., Ломадзе В., Василів Н.С. (м. Київ, Україна)
	Сучасні методи хірургічного лікування тяжких форм позаскреневої симптоматичної епілепсії
11 ⁴⁰ – 12 ⁰⁰	Вастьянов Р.С. (м. Одеса, Україна)
	Пептидергічні патогенетичні механізми хронічної епілептичної активності
12 ⁰⁰ – 12 ²⁰	Харитонов В.І. (м. Київ, Україна)
	Ефективність топірамату при енцефалопатичних формах епілепсії у дітей
12 ²⁰ – 12 ⁴⁰	Дубенко А.Є., Васильєва О.О. (м. Харків, Україна)
	Післямаркетінгові клінічні дослідження клінічної ефективності та безпечності препарату «ОКСАПІН»
12 ⁴⁰ – 13 ⁰⁰	Євтушенко С.К. (м. Харків – Донецьк, Україна)
	Гострі епілептичні енцефалопатії з епілептичним статусом при участі гіпертермії і механізмів запалення (AETIMSE – синдром)
13 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	Обід
14 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	Пленарне засідання №6
Головуючі:	Носов С.Г., Брозь Р.В.
14 ⁰⁰ – 14 ²⁰	Кожина Г.М., Коростій В.І. (м. Харків, Україна)

- 14²⁰ – 14⁴⁰ Психоосвітні програми в комплексній реабілітації хворих на епілепсію
Носов С.Г. (м. Дніпропетровськ, Україна)
Невротичні та неврозоподібні розлади у хворих на епілепсію: діагностика і лікування
- 14⁴⁰ – 15⁰⁰ **Брозь Р.В., Шاپіро Б.К., Мілан М.В., Ришковська О.В. (м. Львів, Україна)**
А тепер – по Протоколу діагностики та лікування епілепсії
- 15⁰⁰ – 15²⁰ **Мостова О.П. (м. Вінниця, Україна)**
Контроверсії в епілептології (по матеріалам CONY-9, Угорщина, м. Будапешт, 2015 р.)
- 15²⁰ – 15⁴⁰ **Муратова Т.М. (м. Одеса, Україна)**
Комбінування фармакологічних та транскраніальних стимуляційних методів в оптимізації лікування епілепсії
- 15⁴⁰ – 16⁰⁰ **Кава-брейк**
- 16⁰⁰ – 18⁰⁰ **Пленарне засідання №7**
Головуючі: Кожина А.М., Горб А.Л.
- 16⁰⁰ – 16²⁰ **Коростій В.И. Кожина А.М. (м. Харків, Україна)**
Комплексна терапія і реабілітація пацієнтів з епілепсією і комор бідними психічними розладами
- 16²⁰ – 16⁴⁰ **Софілканич Н.В. (м. Ужгород, Україна)**
Діагностика, клінічний перебіг та методи корекції когнітивних та афективних розладів у пацієнтів із скроневою епілепсією
- 16⁴⁰ – 17⁰⁰ **Горб А.Л. (м. Херсон, Україна)**
Комбінована протисудомна терапія дитячих епілепсій. Деякі клінічні та соціально-економічні аспекти

- 17⁰⁰ – 17²⁰ **Бітерліх Л.Р. (м. Суми, Україна)**
20-річний досвід використання і
удосконалення автоматизованої системи
підбору антиепілептичного препарату.
Додаткові можливості і глобальні концепції
- 17²⁰ – 17⁴⁰ **Сухоносова О.Ю. (м. Харків, Україна)**
Оцінка якості життя дітей хворих на епілепсію
- 18³⁰ **Дружня вечере**

19 вересня 2015 р.

- 08⁰⁰ – 09⁰⁰ **Сніданок**
- 09⁰⁰ – 11⁰⁰ **Пленарне засідання №8. Клінічна
нейрофізіологія (Відеоконференція)**
- Головуючі:** **Зубов П.Г., Мар'єнко Л.Б.**
- 9⁰⁰ – 9²⁰ **Тардов М.В. (м. Москва, РФ)**
Допплерографія при еклампсії
- 9²⁰ – 9⁴⁰ **Некрасова В. В.
(м. Санкт-Петербург, РФ)**
Роль відео-ЕЕГ моніторингу у комплексній
інструментальній діагностиці затримок
розвитку та мови у дітей
- 9⁴⁰ – 10⁰⁰ **Пушной П.В. (м. Санкт-Петербург, РФ)**
Стандарти опису відео-ЕЕГ моніторингу
- 10⁰⁰ – 10²⁰ **Корольова Н.Ю.
(м. Санкт-Петербург, РФ)**
Роль відео-ЕЕГ моніторингу на етапі
нейрорадіологічної передопераційної
діагностики епілепсії
- 10²⁰ – 10⁴⁰ **Калашников В.І. (м. Харків, Україна)**
Допплерографічні співставлення у хворих з
епілептичними та мігренозними нападами
- 10⁴⁰ – 11⁰⁰ **Кава-брейк**

11 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	Пленарне засідання №8. Клінічна нейрофізіологія (продовження)
Головуючі:	<i>Калашиников В. І., Харитонов В.І.</i>
11 ⁰⁰ – 11 ²⁰	Мар'єнко Л.Б. (м. Львів, Україна) Роль ЕЕГ у виборі тактики лікування при епілепсії
11 ²⁰ – 11 ⁴⁰	Студеняк Т.О. (м. Ужгород, Україна) Відео-ЕЕГ: Коли? Кому? Як?
11 ⁴⁰ – 12 ⁰⁰	Терещенко Г. М. (м. Чернігів – Одеса, Україна) Нейровізуалізація при епілепсії. Можливості Одеського регіона
12 ⁰⁰ – 12 ²⁰	Скачкова Н.А. (м. Київ, Україна) Застосування ТМС в епілептології
12 ²⁰ – 12 ⁴⁰	Зубов П.Г. (м. Одеса – Луганськ, Україна) Кількісна ЕЕГ та методи нейромодуляції при епілептичній активності головного мозку
12 ⁴⁰ – 13 ²⁰	Загальні збори членів УПЕЛ

Закриття конференції

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

1. Бабкіна Ю.А. (м. Харків, Україна)
Оптимізація патогенетичного лікування хворих на епілепсію з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця
2. Гримайло В.М. (м. Харків, Україна)
Епілепсія та порушення серцевого ритму
3. Гринків Я.О. (м. Львів, Україна)
Аптека, спеціалізована по обслуговуванню хворих на епілепсію
4. Денисенко О.В. (м. Одеса, Україна)
Різновиди електричної активності кори мозку щурів при пентилентетразоловому кіндлінзі
5. Завязкіна Н.В. (м. Київ, Україна)
Психологічні критерії обмеженої осудності хворих на епілепсію
6. Копйова Н. В. (м. Одеса, Україна)
Патогенетична роль підкіркових утворень мозку при пілокарпін-індукованих спонтанних судомах
7. Коростій В.І., Герасимов Б.О. (м. Харків, Україна)
Клініко-патопсихологічні особливості когнитивних порушень у пацієнтів з різними клінічними формами епілепсії
8. Муратова Т.М., Стоянов О.М., Олійник С.М. (м. Одеса, Україна)
Сучасні підходи для корекції коморбідних станів при епілепсії
9. Носов С.Г. (м. Дніпропетровськ, Україна)
Диференційна діагностика парціальних вісцеро-вегетативних епілептичних нападів та панічних атак
10. Олексюк-Нехамес А.Г. (м. Львів, Україна)
Викликані сомато-сенсорні потенціали (ВССП) як метод диференційної діагностики пароксизмальних еквівалентів на фоні захворювань ЦНС у дітей різного віку
11. Прищепа О.О. (м. Одеса, Україна)
Нейропатофізіологічні механізми моделі пролонгованого кіндлінга.
12. Сергієнко О.В., Сазонов С.О., Дубенко А.Є., Герасимов Б.А. (м. Харків, Україна)
Необхідність створення реєстру хворих на епілепсію (аналіз статистичних даних)

13. Стоянов О.М., Муратова Т.М., Бакуменко І.К., Павлішина Н.М., Скоробреха В.З., Стамова О.С. (м. Одеса, Україна)
Особливості психоемоційного стану у хворих на посттравматичну епілепсію
14. Стоянов О.М., Муратова Т.М., Горанський Ю.І., Лебідь О.П., Добровольський В.В., Герцев В.М., Олійник С.М., Павлішина Н.М. (м. Одеса, Україна)
Преморбідні вегетативні дисфункції в клініці посттравматичної епілепсії
15. Стрельникова І.М., Черкасова А.А. (м. Харків, Україна)
Сучасний погляд на проблему соціальної стигматизації хворих на епілепсію
16. Танцура Є.О. (м. Харків, Україна)
Місце стану системи цитохромів Р450 у формуванні фармакорезистентності епілепсії
17. Третьяков Д.В. (м. Харків, Україна)
Роль спадкової обтяженості по епілепсіям у перебігу епілептичної хвороби у дітей
18. Черкасова А.А., Стрельникова І.М. (м. Харків, Україна)
Сучасна модель медико-психологічного супроводу підлітків, що страждають на епілепсію
19. Шейніна Т.Л. (м. Харків, Україна)
Особливості порушень розвитку спектру аутизму у дітей, хворих на епілепсію
20. Якубенко Ю.В. (м. Харків, Україна)
Цефалічний синдром у хворих з наслідками ЧМТ



ФАРМАСТАРТ
неврологія • психіатрія

ЛЕВИЦИТАМ

(леветирацетам)



- Доказанная эффективность при парциальных и генерализованных (в том числе миоклонических) типах припадков^{1,2}
- Достоверно уменьшает частоту припадков у взрослых и детей с рефрактерной эпилепсией^{3,4}
- Высокий профиль безопасности⁵
- Самый доступный по цене леветирацетам в Украине⁶

¹ Loring JW, Williamson A. *Epilepsia*. 2011; Mar 5; 71(4):489-514.

² Epilepsia M, Cordonnier C, Brodie A. *Epilepsia*. 2011; Jan 47(1):47-52.

³ French J, Arzoo C. *Epilepsia*. 2005; Feb 46(2):334-6.

⁴ Tockevidakis SH, Ojaghi M, Kallinowski P, et al. 2010; Aug 96(2):273-7.

⁵ French J, Arzoo C. *Epilepsia*. 2005; Feb 46(2):334-6.

⁶ Сравнительные цены на леветирацетам в Украине.

Мы делаем качественное лечение доступным!



ООО "Фарма Старт", Украина, 63124, г. Киев, бульв. Я. Галуса, 8
Тел.: (+38-044) 484-85-85 • www.phs.com.ua

ОКСАПІН®

ОКСАРБАЗЕПІН 300 мг

Новий рівень контролю епілепсії:

Легкий старт і контроль терапії

Високий профіль безпеки

Доведена ефективність на рівні «золотого стандарту»*



НАВІТЬ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» МОЖНА ПОКРАЩИТИ!

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.
ОКСАПІН® РП, МОЗ України № ІА/11096/01/01 від 13.10.10 р. № 865. **Склад:** 1 таблетка містить окскарбазепіну 300 мг.
Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою. **Фармакогруппа.** Протиепілептичні засоби. Код АТС N03A.
ТОВ: Клінічні характеристики. **Показання.** Лікування первинного нападів з або без вторинної генералізації тоніко-клонічних судом як монотерапія або додаткова терапія у дорослих та дітей старше 6 років з епілепсією. **Побічні реакції.** Можливі ускладнення з боку системи кровообігання, внутрішньої системи, обміну речовин, центральної нервової системи, органів чуття, серцево-судинної системи, травної системи, шкіри, можуть змінюватися лабораторні показники. Найчастіше повідомлялося про наступні побічні ефекти: сонливість, головний біль, запаморочення, діарея, нудота, болючість, втомиленість, біль у м'язах. **Категорія візусу.** За рецептом.
Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату.



Офіційний
дистрибутор:
ТОВ «Гладфарм» ПТД,
тел.: 0(44) 495-82-88
www.gladpharm.com



Виробник:
Кусум Хелтхкэр ПБТ, ПТД
тел.: 0(44) 495 82 88
www.kusumhealthcare.com

* The Epilepsies. The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Pharmacological Update of Clinical Guideline 20, National Clinical Guideline Centre P 216, 218 – January 2012



ТОПАМАКС®
мікрогранули топірамату



ТОП доверия МАКСимум жизни

- ✓ Діє на всі відомі механізми епілептогенезу^{1,2}
- ✓ Ефективний при всіх типах нападів^{1,2}
- ✓ Передбачуваний профіль безпеки²



Скорочена версія Інструкції для медичного застосування препарату ТОПАМАКС®

Склад: 1 капсула містить топірамату 25 мг або 50 мг.

Лікарська форма. Капсули.

Фармакотерапевтична група. Протиепілептичні засоби. Код АТС N03AX11.

Показання. Як монотерапія для лікування дорослих та дітей віком від 6 років з парціальними нападами з або без вторинно генералізованих нападів та первинно генералізованих тоніко-клонічних нападів. Як додаткова терапія для лікування дорослих та дітей віком від 2 років з парціальними нападами з або без вторинно генералізованих нападів або первинно генералізованих тоніко-клонічних нападів та лікування нападів, асоційованих із синдромом Лепко-Гаставі. Для профілактики нападів мігрені у дорослих, після ретельної оцінки можливостей апіративного лікування. Топірамат не рекомендовано для лікування гострих станів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Профілактика мігрені у вагітних та жінок репродуктивного віку, якщо вони не застосовують ефективних методів контрацепції.

Спосіб застосування та дози. Див. Інструкцію для медичного застосування.

Побічні реакції. Найчастішими небажаними реакціями з частотою появи > 5% та більше у ході клінічних досліджень із застосуванням

топірамату були: анорексія, зниження апетиту, брадикардія, депресія, порушення мовлення, безсоння, порушення координації рухів, порушення концентрації уваги, запаморочення, дисартрія, сплутворення смислу, гіпостезія, летаргія, порушення пам'яті, нистім, парестезія, сонливість, тремор, дитинство, порушення зору, дисорієнтація, підвищена втомлюваність, дратівливість та зменшення маси тіла. Складено повного профілю безпеки препарату — див. Інструкцію для медичного застосування.

Діти. Моніторинг епілепсії — застосовувати дітям віком від 6 років. Додаткова терапія (парціальні напади з або без вторинної генералізації, первинні генералізовані тоніко-клонічні напади чи напади, асоційовані з синдромом Лепко-Гаставі) — застосовувати дітям віком від 2 років. Мігрена — не рекомендовано для лікування чи профілактики мігрені у дітей через недостатність даних з безпеки та ефективності.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі до 25 °C у сухому, недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 28 капсул у флаконі в картонній паці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Janssen-Cilag GmbH, Сінт-Віксен-Стеат, Сінт-Андреас.

Поряд призначення. слід ознайомитися з повною ін-

струкцією для медичного застосування.

РП МОЗ України №04/4144/01/02, 01/4144/01/03 від 28.01.2011 терміном на 5 років. Текст складено у відповідності з Інструкцією для медичного застосування, яку затверджено МОЗ України 28.01.2011 р. з змінами від 24.09.2014 р.

1. Shank R.P. et al., Epilepsia, 2000, 41 (suppl. 1): p. 3-9. 2. Бурда С.Г. Епілепсія та пароксизмальні стани, 2011, том 3, №1.

За повною інструкцією звертайтеся до ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна»:

04070, м. Київ, вул. Саксагань, 30.

Тел.: +38 (044) 490 64 64, факс: +38 (044) 490 64 65.

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
of Johnson & Johnson

ЕНКОРАТ ХРОНО

Лікування

- генералізованих епілептичних нападів
- парціальних епілептичних нападів
- синдрому Леннокса-Гасто
- маніакального синдрому при біполярних розладах



ЗЕПТОЛ

Карбамазепін

- Епілепсія

- складні або прості парціальні судомні напади (із втратою або без втрати свідомості) із вторинною генералізацією або без неї
- генералізовані тоніко-клонічні судомні напади
 - змішані форми судомних нападів

Препарат можна застосовувати як монотерапію,
а також у складі комбінованої терапії

PDF GENERATED BY: www.pdf24.com

Дана інформація призначена виключно для дисциплінованих фахівців медичної сфери, а також для поширення на симпозіях, конференціях, семінарах та на медичну тематику. **Загад С** протипоказаний. Рекомендуємо ознайомитися з повною інструкцією по застосуванню лікарського засобу.

Представництво Сан Фармацевтікел Індастріз ЛТД.:
01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, офіс 315.



SANOFI в епілептології

Депакін* — перша лінія терапії епілепсії у дітей та дорослих як при генералізованих, так і при фокальних типах нападів**



ЩОРІЧНИЙ
КОНКУРС
ПРОФЕСІОНАЛІВ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ПАНАЦІЯ
ПРЕПАРАТ РОКУ 2011

Показання

- Дорослі та діти.¹⁻⁴ У вигляді монотерапії або в комбінації з іншими протиепілептичними препаратами для:
 - лікування генералізованих епілептичних нападів (клонічних, тонічних, тоніко-клонічних нападів, абсансів, міоклонічних та атонічних нападів); синдрому Леннокса-Гасто;
 - лікування парціальних епілептичних нападів (парціальних нападів із вторинною генералізацією чи без).
- Діти.³ Профілактика повторних нападів після однієї або більше фебрильних судом відповідно до критеріїв ускладнених фебрильних судом, коли переривчаста профілактика бензодіазепінами неефективна.

SAUA VPA.15.06.0088

Спосіб застосування та дозування

— новонароджені та діти до 12 років: 30 мг/кг (перерву при застосуванні слід надавати сервіс, оральним розчином або гранулам пролонгованої дії);
— діти (від 12 до 18 років) та дорослі: 20–30 мг (перерву при застосуванні слід надавати таблетками, таблетками пролонгованої дії або гранулам пролонгованої дії).

Противказання

Підвищена чутливість до вальпроату, дивальпроату, вальпроату або до будь-якого з компонентів лікарського засобу в анамнезі. Гострий гепатит. Хронічний гепатит. Випадки тяжкого гепатиту в індивідуальному або сімейному анамнезі пацієнта, особливо спрощені лікарськими препаратами. Печінкова порфірія. Комбінація з мепрфіном (екстрактом звіробою (дів. рослин «Васильця» з іншими лікарськими засобами та інш. види взаємодій)).

Діти в масі тіла менше 17 кг. Діти вагіди до 6 років (інформація для таблетованих форм препарату у ж. класу з ризиком потрапляння таблеток у випадку шлунку при ковтанні).

Побічні реакції

Можливі побічні реакції з боку крові та ліфатичної системи, нервової системи, органів слуху та рівноваги, травного тракту, нирок і сечовидільних шляхів, шкіри та підшкірної клітковини, судини розлади, метаболічні та ендокринні розлади, розлади в бов ниркової системи, ектодермні розлади, розлади з боку репродуктивної системи та молочних залоз, окочення, ерозії, свербіж та гострі розлади.

Інформація наведена у скороченому вигляді. Більш детальна інформація щодо препарату наведена в інструкції для медичного застосування препарату.

* В Україні представлені наступні форми випуску препарату Депакін: Депакін Хроно 300 мг; Депакін Хроно® 500 мг; Депакін® Ентерик 300; Депакін® (сірп).

** МСД — Світовий Співіт 20. The worldwide prevalence of the syndrome is stable and similar in many and secondary care. 2004. www.elsevier.com/locate/epilepsia

† Інструкція для медичного застосування препарату Депакін Хроно 300 мг. Наказ МОЗ України від 30.08.2011 № 542. Реєстраційне посвідчення № UA10096/01/01.

† Інструкція для медичного застосування препарату Депакін Хроно® 500 мг. Наказ МОЗ України від 10.10.2014 № 715. Реєстраційне посвідчення № UA10118/01/01.

† Інструкція для медичного застосування препарату Депакін®. Наказ МОЗ України від 21.05.2013 № 297. Реєстраційне посвідчення № UA2077/01/01.

† Інструкція для медичного застосування препарату Депакін® Ентерик 300. Наказ МОЗ України від 03.01.12 № 2. Реєстраційне посвідчення № UA2258/02/01.

Депакін Хроно® 500 мг — першокласник в номінації «Підприємство року» Шриного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панація 2011». Докази № 1 від 31.08.2011 до Додатку № 1 від 31.08.2011 до Додатку № 1 від 31.08.2011.

Інформація про лікарський засіб представлена для медичних та фармацевтичних працівників для розповсюдження на спеціалізовані семінари, конференції, симпозіуми з медичної тематики.

А також для розширення у спеціалізоване видання, призначеного для медичних установ та лікарів. Інформація подана скорочено. З повною інформацією про препарат можна ознайомитися

в інструкції для медичного застосування препарату.

Tel: «Sanofi-Aventis Україна», Київ, 01033, вул. Житомирська, 48-50а, тел.: +38 (044) 354 20 00, факс: +38 (044) 354 20 01, www.sanofi.ua



